NOTE XXV.

DESCRIPTION D'UN DYTISCIDE NOUVEAU.

PAR

M. RÉGIMBART.

Laccophilus coccinelloides, n. sp.

Long. 5 mill. — *Ovalis, sat elongatus, postice attenuatus, parum convexus. Capite et pronoto pallide testaceis, hoc postice sat late, illo postice in medio nigro et in elytris fortiter producto. Elytris nigris, ad latera vitta submarginali medium attingente, maculisque duodecim aliis albido-testaceis singulatim ornatis; corpore subtus, pedibus et antennis fulvo-testaceis. Supra tenuissime reticulato et vix visibiliter punctulato.*

Cette grande et charmante espèce se place au voisinage des *L. pictus* Cast. et *insignis* Sharp, mais s'en distingue par le nombre et la disposition de ses taches qui sont ainsi disposées: une bande submarginale s'étendant de la base au milieu où elle se dilate en dedans, quatre taches sublatérales dont les trois premières sont plus ou moins réunies à la bande submarginale, trois taches médianes en série longitudinale, quatre taches juxta-suturales et une subapicale étendue transversalement. Le dessus du corps est pourvu d'une double réticulation très-fine et de points très-petits et peu apparents situés à l'intersection des aréoles.

Etats Unis: Arizona central (Dr. H. ten Kate).